

في أي عمر يجب إجراء الفحص؟

- وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية فإنه ينصح بإجراء الفحص من عمر 30 عاماً فما فوق أما الفحوصات التي تجرى للأعمار دون سن 30 فتكون بحسب الحاجة الطبية ووفقاً لتوصية من الطبيب.
- إذا لم تتوفر الإمكانية لإجراء الفحص إلا لمرة واحدة بالعمر يفضل إجراؤه في سن (35-45) عاماً.
 - السيدة التي يتجاوز عمرها الخمسون عاماً عليها إجراء فحص وقائي كل 5 سنوات فقط.
 - أما السيدة ما بين عمر (25-49) سنة فيجربى لها الفحص فقط في كل 3 سنوات.
 - أما بالنسبة لعمر 65 وما فوق فلا ينصح به وخصوصاً إذا جرى الفحص سابقاً.
 - لا ينصح بعمل الفحص كل عام لأي عمر من الأعمار.

أين تجرى فحوصات مسحة عنق الرحم؟

تجرى عادةً هذه الفحوصات في عيادات الطب النسائي، ولحسن الحظ فإن جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية تقدم هذه الخدمة من خلال مراكز تقديم خدماتها المنتشرة في الضفة وغزة، (راجعى عناوين مراكز تقديم الخدمة في آخر المطوية).



تؤمن الجمعية بان جميع الاشخاص بدون أي تمييز لهم الحق في التعلم والحصول على المعلومات ،هذا يندرج تحت المادة الثامنة من الحقوق الجنسية التي تم اعلانها من قبل الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة بشأن الحقوق الجنسية والذي ينص على الحق في التعلم والمعلومات

المكتب التنفيذي

القدس - وادي الجوز - المنطقة الصناعية - عمارة التنور ، ، هاتف: ٠٢-٦٢٨٣٦٣٦ / ٠٢-٦٢٨٠٦٣٠ ، فاكس: ٠٢-٦٢٦١٦٧٥

للإستفسار عن ساعات الدوام ومواعيد الأطباء الرجاء الإتصال على ارقام الهواتف التالية:

مركز تقديم الخدمة الخليل:

عين سارة - عمارة الأمل بالله - الطابق الثالث / ٠٢-٢٢٢٨٨٥٧

مركز الخدمات الصديقة للشباب :

عين سارة - عمارة الأمل بالله - الطابق الرابع / ٠٢-٢٢١٩١٨٧

مركز تقديم الخدمات غزة

مركز الخدمات الصديقة للشباب - حي الرمال - شارع النصر

فوق مطبخ بيروت - الطابق الأول / ٠٨-٢٨٤٨٦٦٧

مركز تقديم الخدمات بيت لحم

باب الزقاق - بجانب مستشفى الحسين الطابق الأول / ٠٢-٢٧٧٠٤٣٨

مركز تقديم الخدمة حلحول

مبنى سيدات حلحول - الطابق الأول / ٠٢-٢٢١٧٢٨٤

مركز تقديم الخدمة رام الله

شارع الإرسال - فوق مخبز الأمين - الطابق الأول / ٠٢-٩٨٠٣٢٠

مركز تقديم الخدمة ابو ديس

البلد القديمة - باطن الزيت / ٠٢-٢٧٩٢٢٦٠

حقوق الطبع محفوظة

الصفحة الإلكترونية: www.pfppa.org, البريد الإلكتروني: info@pfppa.org


انضموا إلى صفحة PFPPA على الفيس بوك



جمعية عضوية

الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

إقليم العالم العربي



سرطان عنق الرحم

تم طباعة هذه المطوية بتمويل من المثلثة النرويجية لدى السلطة الوطنية



سيدتي

احمي نفسك من الإصابة بسرطان عنق الرحم....

لم تعد السرطانات مصدر خوف وفزع لأن توفر المعلومات حول عوامل الخطر وطرق الوقاية والكشف عن هذه الأمراض مبكراً قد أدى إلى السيطرة عليها...
فهل نتثقف ونتواقى...!

تنتشر الأمراض السرطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الرجال والنساء على حد سواء، مع وجود فروقات بين الجنسين في مدى انتشار هذه الأمراض. حيث ينتشر مرض سرطان الرئة والخصيتين بين الرجال، فيما ينتشر سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم بين النساء إضافة إلى أمراض سرطانية أخرى تنتشر بين الجنسين.

ما هو السرطان بشكل عام؟

السرطان هو مجموعة من الأمراض غير المعدية، يزيد عددها عن المائة مرض، متشابهة في بعض خصائصها، وتعود تسمية هذا المرض بالسرطان نظراً لأن الأوعية الدموية المنتفخة حول الورم تشبه أطراف سرطان البحر. وهذا المرض أو هذه الأمراض تنتج عن خلل في نمو الخلايا من حيث العدد والشكل مما يحدث تغير في هذه الخلية الأمر الذي يجعلها تخرج عن نظام التحكم في عملها كما في الخلايا السليمة.



ما هو عنق الرحم وما هو السرطان الذي يصيبه؟

عنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم وهو عبارة عن قناة تصل ما بين الرحم والمهبل. ويصيب هذا الجزء من الرحم ما يعرف بسرطان عنق الرحم. ويحدث سرطان عنق الرحم عندما تبدأ خلاياه المبطنة بالتغير التدريجي في طبيعته ووظيفته نتيجة تدمير الخلايا مما يؤدي إلى تعثر نموه بصورة طبيعية وحدوث السرطان الذي يمتد تأثيره إلى الأنسجة المجاورة. وعندما تبدأ هذه التغيرات السرطانية في الحدوث تكون محدودة في الطبقة الخارجية من عنق الرحم لمدة تتراوح من 2 - 10 سنوات قبل أن تبدأ في مهاجمة الطبقة العميقة من عنق الرحم لتبدأ بعدها في مهاجمة الأنسجة والأعضاء المجاورة للرحم والمثانة والمستقيم. وتشير الدراسات الطبية بأن أكثر فترة لتعرض النساء بهذا المرض هو بين سن (45 - 50) عاماً، ولكن هذا لا يعني بأن الفئات الأصغر لا يصيبها المرض.

أعراض سرطان عنق الرحم

- النزيف المهبلي، نزيف غير منتظم ونزيف بعد الجماع.
- إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة من الممكن أن تكون مصحوبة بالدم.
- نزيف دموي بعد الممارسة الجنسية وألم خلال الممارسة الجنسية.
- الألم هو علامة متأخرة للإصابة.



أسباب الإصابة بالمرض

- الزواج المبكر تحت سن 17 وممارسة الجنس مبكراً.
- الحمل المتكرر بفواصل زمنية أقل من سنتين.
- الجماع مع أكثر من شخص.
- الإصابة بالعدوى المنقولة جنسياً مثل عدوى السفلس والهربس والإيدز.
- تدخين التبغ بأشكاله.
- التقرحات والثوالب التي تصيب عنق الرحم.

مسحة عنق الرحم والاكتشاف المبكر للمرض:

لحسن الطالع أن هذا النوع من الأورام الخبيثة يمكن اكتشافه مبكراً جداً وعلاجه وذلك من خلال إجراء فحص دوري لعنق الرحم يعرف "بمسحة عنق الرحم" والذي يجري من قبل الطبيب الأخصائي لاكتشاف أي تغيير غير طبيعي ومعالجته حسب قرار الطبيب المعالج. وللطمأنينة فإن هذا الفحص غير مؤلم وبسيط ولا يحتاج إلا بضعة دقائق وبدون تخدير. حيث تقوم السيدة بالاستلقاء على ظهرها بوضعية معينة ويتم أخذ عينة من عنق الرحم عن طريق أداة خاصة من الخشب أو البلاستيك توضع على شريحة زجاجية وترسل للمختبر للفحص لتحديد الخلايا غير الطبيعية. وعندما تظهر نتيجة العينة بوجود خلايا غير طبيعية، تحتاج السيدة في هذه الحالة لفحوصات خاصة لتأكيد التشخيص ونوع العلاج الواجب استخدامه، حيث أن قليل من الفحوصات تكون حالة سرطانية، وكثير من التغيرات في خلايا عنق الرحم ناتجة عن الالتهابات.

